

DAVID. SIEGISM. AUG. BÜTTNERI

Chemnicensis,

ENUMERATIO METHODICA  
PLANTARUM,

Carmine

CLARISSIMI

JOANNIS CHRISTIANI CUNO

recensitarum.



AMSTELÆDAMI,

Apud JAC. CORN. SCHOOTS VAN CAPPELLE.

**Nota.**

**Litteræ vs. cum numeris & reliquis signis,  
CUNONIANI carminis versus designant.**





# ENUMERATIO PLANTARUM

## METHODICA.

**ELOSIA** foliis lanceolato-ovatis. Lin. h. Cliff. p. 43.  
*Amaranthus panicula incurva* &  
*Amaranthus panicula cristata.* J.  
 B. vs. 83. a.

**HELXINE** foliis ovatis, caule recto inermi.  
 Lin. h. Upf. p. 96.

*Persicaria Orientalis Nicotianæ folio, calyce florum  
 purpureo.* Tournef. Cor. 38. vs. 337. y.

**GRAMEN** aquaticum paniculatum, Phalaridis semine. J. R. H. Hall. Helv. p. 222.

*Arundo foliis planis, panicula spicata, spiculis confertis* Lin.

Var. IV. Hall. Helv.

*Gramen sulcatum vel striatum album.* Lob.  
 vs. 268. s.

**NEOTTIA** bulbis subrotundis, nectarii labio quadrifido. Lin. Act. Upf. 1740. p. 32.

*Orchis antropophora oreades* Column. Eschr. 1.  
 p. 320.

*Orchis flore nudi hominis effigiem repræsentans, femina.* C. B. Pin. 82. vs. 271. e.

**CANNA** foliis ovatis, utrinque acuminatis, nervosis. Roy. Pr. 11.

*Canna spathulis bifloris.* Lin. H. Cliff. 1.

*Canna indica.* Clus. Hist. 81.

*Cannacorus amplissimo folio, flore rutilo.* J. R. H.  
 vs. 296. q.

**CUNONIA** floribus sessilibus, spathis maximis. vid. Tabulam.

*Esther Cl. Cunonis.* vs. 254-260. w.

### CHARACTER

**CAL.** Spathæ bifoliæ, imbricatæ, persistentes, flores distinguentes.

**COR.** Flos monopetalus irregularis, papilionaceus fere, cujus

Pars superior (vexillum æmulans horizontale) ab initio angusta, continuatur in semicanalem longissimum, qui genitalia coercet; postea dilatatus & cochlearis in modum excavatus, apices & stigma tegit.

Pars inferior (carinam referens) gibbosa, leviter trifida, brevissima, introflexa.

Partes duæ laterales (alæ) medio semicanalis vexilli perpendiculariter adnatæ, lanceolatae, ejusdem fere latitudinis ac longitudinis, vexillo longe breviores.

**NECT.** Cavum in posteriore parte carinæ, ad exortum staminum; liquorem continens.

**STAM.** tria, longitudine fere vexilli. Apices sagittatæ.

**PIST.** Germen infra receptaculum. Stylus longitudine & situ staminum. Stigma trifidum, dilatatum in apice & excavatum.

**PERIC.** Capsula oblonga, ventricosa, trigona, trivalvis, trilocularis, Semina numerosa continens, quorum bini semper ordines uni valvæ per longitudinem interioris anguli adhærent, duobus vicinis se mutuo implicantibus.

**SEM.** (Ulmi fere) membrana tenui, compressa, lata, cincta, quarum singula unicum rotundum durissimum semen involvit.

#### DESCRIPTIO.

Radix tuberosa, nunc rotundo lobata, nunc compresso plana; externe tunica fusca, nerveis filamentis longitudinalibus & transversalibus intertextis, obducta. Interna substantia, seu caro compacta, coloris pallide lutei.

Folia (Gladioli seu Antholyzæ) pauca, ab  
utra-





*CUNONIA floribus sessilibus Spathis maximis.*

*J. C. S. V. Gappelle excudit.*

*J. Schenk sculpsit.*





utraq[ue] parte caulis posita, striata, rigidiuscula, acumine terminata, summa caulina spatharum instar non striata, lævia & glauca sunt.

Thyrsus cubitalis & bicubitalis, unicus, non ramosus, aliquoties inæqualiter incurvus, glaucus, glaberrimus.

Flores alternatim ab utraque parte in uno plano positi, spicati, sessiles, spathis semutuo amplexantibus inferius cincti; alis erectis avolantes quasi, speciosissimæ & ardentissimæ rubedinis.

Est genus intermedium Gladiolum inter & Antholyzam.

Gladioli differunt: corolla hexapetala campaniformi, nectario deficiente, seminibus exiguis, radice plerumque duplici. Horum 20 & plures vidi, quorum plerosque Dn. Cuno e Capite bonæ spei acceperat. Antholyzæ vero differunt; corolla ringente & seminibus triquetris.

CUNONIAM dixi a Dn. Joanne Christ. CUNO, mercatore Amstælodamensi, poetæ juxta ac botanices cultore strenuo, qui primus hanc, quam in horto suo servat, splendidissimam plantam, nomine & descriptione, licet poetica, donavit.

#### EXPLICATIO FIGURÆ.

Fig. I. Planta florens, ad tellurem abscissa.

Fig. II. Flos integer.

A. Tubus.

B. Carina trifida.

C. Alæ duæ.

D. Vexillum. f. Labium superius.

E. Stigma trifidum.

F. Stamina tria.

Fig. III. Capsula seminalis matura, tribus valvis dehiscens.

G. G. Spathæ binæ.

H. Semina in situ.

Fig. IV. Semen perfectum cum calyptra magnitudine naturali.

Fig. V. Radix.

? CUNONIA floribus pedunculatis, spathis minimis.

*Gladiolus Æthiopicus*, flore coccineo. J. Corn. Canad. p. 78. fig. 79. Moriss. sect. 4. Tab. 23. *Gladiolo Affinis*. s. *Antholissa*. Weinm. Phyt. Tab. 546. vs. 260. w.

IRIS corollis barbatis, caule foliis longiore unifloro. Lin. h. Cliff. p. 18. Roy. Pr. 17.

*Iris fusiana*, flore maximo ex albo nigricante. C. B. Pin. 31. Moriss. Hist. 11. p. 351. S. 4. T. 6. fig. 6. vs. 250. l.

IRIS corollis imberbibus, foliis subulato-canaliculatis, caule brevioribus. Lin. h. Upf.

*Iris foliis margine conniventibus, corollis imberbibus*. Linn. h. Cliff. p. 20.

*Xiphium cæruleo violaceum*. I. R. H. vs. 250. m. n. o. Et varietates.

CROCUS vernus folio plano alba linea diviso. Hall. Helv. 281.

*Crocus floribus fructui impositis, tubo longissimo*. Roy. 41.

*Crocus vernus latifolius, flavus*. C. B. Pin. 66. vs. 105. d.

COLCHICUM foliis planis erectis. Linn. h. Cliff. 140.

*Colchicum commune*. C. B. Pin. p. 67. vs. 201. e.

COLCHICUM foliis undulatis, patentibus. Linn. h. Cliff. 140.

*Colchicum variegatum*. Corn. Canad. 136.

*Colchicum Cbionense*, floribus fritillariæ instar tessellatis, foliis undulatis. Boerh. 2. p. 117. vs. 301. e.

LEUCOIUM petalis æqualibus. Hall. Helv. 284.

*Leucoium*. Linn. h. Cliff. 135.

*Narcissoleucoium vulgare*. J. R. H. vs. 70. \*

LEUCOIUM, petalis inæqualibus.



*Galanthus*. Linn. h. Cliff. 134. h. Upf. 73.

*Narcissoleucoium trifolium minus*. J. R. H. vs. 70.\*

NARCISSUS scapo unifloro, nectarii limbo rotato brevissimo. Linn. h. Upf. p. 74.

*Narcissus albus circulo purpureo*. C. B. Pin. p. 48. vs. 105. c.

NARCISSUS scapo unifloro, nectarii limbo campanulato, erecto, petala æquante. Linn. h. Upf. p. 74.

*Narcissus luteus sylvestris*. Dod. Pemp. 227. f. 1. 2. vs. 105 & 247. g.

NARCISSUS scapo multifloro, nectario campanulato brevi, foliis subulatis. Linn. h. Upf. p. 74.

*Narcissus juncifolius secundus*. Clus. hist. 1. p. 60. vs. 104. b.

AMARYLLIS spatha uniflora, corolla æquali, staminibus declinatis. Linn. h. Cliff. 135.

*Lilionarcissus luteus autumnalis major*. J. R. H. vs. 301. e.

AMARYLLIS spatha uniflora, corolla inæquali, genitalibus declinatis. Linn. h. Cliff. 135.

*Amaryllis formosissima*. Act. Stockh. 1742. p. 93. vs. 252. s.

AMARYLLIS multiflora, foliis linguæformibus, corolla inæquali.

*Amaryllis spatha multiflora, foliis ovato oblongis, obtusis*. Roy. p. 37.

*Lilionarcissus indicus, maximus, sphericus, floribus pluribus rubris liliaceis*. Moris. II. p. 568. f. 4. T. 10. f. 35. vs. 297. u.

ALOE. Linn. Gen. 343. vs. 331. u.

AGAVE. Linn. Syst. Nat. 1748. p. 97.

HYACINTHUS corollis infundibuliformibus semisexfidis basi ventricosus. Linn. h. Cliff. p. 125. Roy. p. 27.



*Hyacinthus Orientalis*. C. B. vs. 95. a. & 104.

POLYANTHES floribus alternis. Linn.  
Vir. 28. h. Cliff. p. 126.

*Hyacinthus indicus tuberosus, flore hyacinthi orientalis*. Baub. Pin. 47.

*Tuberosa*. Magnol. Charact. 178. vs. 301. d.

POLYANTHES floribus umbellatis. Linn.  
Vir. 29. h. Cliff. p. 126.

*Hyacinthus africanus tuberosus, flore cœruleo umbellato*. Commel. hort 2. p. 133. t. 67. vs. 301. d.

LILIUM foliis sparsis, corollis campanulatis erectis, intus scabris. Linn h. Cliff. 120.

*Lilium purpureo croceum majus*. C. B. Pin. 76. v. 250.

LILIUM foliis sparsis, floribus reflexis, corollis revolutis. Linn. h. Cliff. p. 120.

*Lilium Byzantinum, miniato saturato flore polyanthes*. Clus. hist. 1. p. 132. vs. 250. q.

FRITILLARIA racemo comoso inferne nudo. Lin. h. Upf. p. 82.

*Petilium foliis lanceolatis*. Lin. h. Cliff. p. 118.

*Corona imperialis* Dodon. vs. 83. e.

FRITILLARIA foliis omnibus alternis. Lin. h. Upf. p. 81.

*Meleagris* Dod. Pempt. 233. vs. 247. e.

FRITILLARIA foliis infimis oppositis. Linn. h. upf. p. 81.

*Fritillaria flore minore*. C. B. Pin. 64. vs. 247. e.

TULIPA scapo triphylo foliis ovato lanceolatis. Lin. h. Upf. p. 82.

*Tulipa*. Auct. vs. 81. 82.

ERYTHRINUM. Lob. Hist. 105. Lin. h. Cliff. 119. Gmel. Sibir. p. 119.

*Dens canis purpurascens flore*. Clus. hist. 1. p. 276. vs. 247. f.

ARGEMONE. H. Cliff. p. 201.



*Argemone mexicana.* I. R. H.

*Papaver spinosum.* C. B. P. 171. vs. 253. v.

P A P A V E R caule multifloro, foliis simplicibus, glabris, incis, caulinis. Lin. h. Upf. p. 136.

*Papaver foliis simplicibus, glabris, incis.* Lin. h. Cliff. p. 200.

*Papaver sativum.* Camer. Epitom. 803.

*Papaver cristatum.* vs. 253.

P A P A V E R caule multifloro, folioso, hispido: foliis pinnatifidis; capsulis lævibus. Lin. h. Upf. 136.

*Papaver foliis pinnatifidis, hispidis, fructu ovato.* Lin. h. Cliff. p. 201.

*Papaver erraticum majus, foliis florum variegatis.* Boerb. H. L. B. p. 280. vs. 253. v.

P A P A V E R foliis pinnatis, fructu acuminato. Lin. h. Cliff. p. 201. Roy. 479.

*Papaver erraticum, pyrenaicum, flavo flore.* C. B. Pin. 171. vs. 253. v.

G L A U C I U M foliis amplexicaulibus glabris, *Chelidonium pedunculis unifloris.* Lin. h. Cliff. 201.

*Glaucium flore luteo.* I. R. H.

*Papaver corniculatum luteum.* C. B. Pin. 171. vs. 253. v.

G L A U C I U M hispidum.

*Glaucium hirsutum, flore phæniceo.* I. R. H.

*Papaver cornutum, phæniceo flore.* Clus. Hist. 2. p. 91. vs. 253. v.

A Q U I L E G I A. Lin. Gen. 541. vs. 269. v.

P Æ O N I A foliis difformiter lobatis. Hall. Helv. 311.

*Pœonia communis fœmina.* C. B. I. R. H. v. 83 d.

P Æ O N I A foliis lobatis, ex ovato lanceolatis. Hall. Helv. p. 311.



*Pæonia flore nigricante splendido, quæ mas. C.*  
*B. I. R. H. vs. 83. d.*

**DELPHINIUM** caule simplici, nectariis monophyllis. Lin. h. Cliff. p. 213.

*Delphinium hortense* & varietates. *I. R. H.*  
*vs. 83. c.*

**DELPHINIUM** nectariis diphyllis, labellis bifidis, apice barbatis, foliis incis, caule erecto. Lin. h. Upf. p. 151.

*Delphinium perenne aconiti folio ampliori, floribus longioribus pediculis insidentibus, minus villosum.*  
*Amm. Ruth. p. 131. vs. 270. b.*

**NIGELLA** foliis involucro folioso cinctis. Lin. h. Cliff. p. 215.

*Nigella angustifolia, flore majore, simplici, cæruleo.*  
*C. B. Pin. p. 145. vs. 298. w.*

**ADONIS** floribus octopetalis, fructibus cylindræo oblongis. Lin. h. Upf. p. 156.

*Adonis radice annua. Lin. H. Cliff. p. 321.*

*Adonis hortensis, flore minore, atro rubente. C.*  
*B. Pin. p. 178.*

*Eranthemum. Dod. Pempt. p. 260. vs. 261. x.*

**HEPATICA.** Lin. h. Cliff. p. 223. Roy. p. 487.

*Ranunculus tridentatus vernus I. R. H. vs. 95. b.*

**ANEMONE.** quæ Pulsatilla, foliis decompositis ternatis. Lin. h. Cliff. p. 223. h. Upf. p. 155. Roy. Pr. p. 487.

*Anemone tenuifolia Boerb. 1. p. 37—39. vs. 83. b.*

**RANUNCULUS** foliis tripartitis laciniatis, caule inferne ramoso, radice tuberosa. Lin. h. Upf. p. 157.

*Ranunculus Asiaticus, grumosa radice. Clus.*  
*Et Varietates. vs. 82. f.*

**ROSA** caule aculeato, petiolis inermibus, calycibus semipinnatis. Linn. Fl. suec. 406.

*Rose*



- Rosæ luteæ. C. B. Pin. Varietas.*  
*Flore intus Kermesino extus luteo. vs. 273.*

## ALCEA.

- I. *Alcea foliis sinuato angulosis. Lin. h. Cliff. p. 348. Roy. Pr. 357. Malva rosea, folio subrotundo. C. B. Pin. p. 315.*  
 II. *Alcea foliis palmatodigitatis. Lin. h. Cliff. p. 348. Roy. Pr. p. 357.*  
*Alcea rosea hortensis, maxima folio ficus. I. R. H.*

Not. Vidi interdum in una eademque planta folia sinuato angulosa & palmata; vidi & de quibus dubitarem: utrum palmata, an vero sinuata dicerem. vs. 309. m.

- MALVA caule erecto, foliis multipartitis. Lin. H. Cliff. p. 347.  
 β *Alcea vulgaris major, flore candidiore. J. R. H. vs. 299. z.*

- CACTUS scandens: angulis decem obsoletis. Lin. h. Upf. p. 121.  
*Cereus minimus scandens, polygonus articulatus. Boerb. vs. 329. f.*

- SAXIFRAGA foliis petiolatis, retusis, ora cartilaginea ferrata, caule nudo. Hal. Helv. p. 400.  
*Saxifraga foliis cordato ovalibus, crenatis, emarginatis, caule nudo. Lin. h. Cliff. p. 167. Roy. p. 453.*  
*Geum subrotundo folio. J. R. H. vs. 98. d.*

- GERANIUM calycibus monophyllis, foliis orbiculato reniformibus, tomentosis, crenatis, integriusculis. Lin. h. Upf. p. 195.  
*Geranium calycibus monophyllis, floribus florentibus erectis, foliis subcordatis. Lin. h. Cliff. p. 345.*  
*Geranium Africanum arborescens, malvæ folio plano lucido, flore elegantissimo Kermesino. Mart. Cent. 3 T. 3.*

**GERANIUM** calycibus monophyllis, foliis cordato orbiculatis incis, zona notatis. Lin. h. Upf.

*Geranium Africanum arborescens, alchimilla hirsuto folio, floribus rubicundis. Comm. Præl 51. T. 1.*

Not. Hæc duo Gerania, ut & reliqua africana arborescentia, hoc plane singulare habent: quod nempe nectarium non in ipso flore, sed potius in pedunculo lateat. Incipit in ima floris parte, calyce scilicet & continuatur sub forma canal, ad tertiam plerumque pedunculi partem. Deinceps ubi evanescit, conspicitur externe in pedunculo tuberculum, & tunc pedunculus extenuatur. vs. 253. u.

**LYCHNIS** floribus fasciculatis, fastigiatis. Lin. h. Cliff. p. 174. h. Upf. p. 115. Roy. prodr. p. 449. Hall. h. goett. p. 34.

*Lychnis hirsuta, flore coccineo, major. C. B. Pin. p. 203.*

*Lychnis Calcedonica miniata. Lob. Hist. p. 183. vs. 153. t.*

**DIANTHUS** floribus aggregatis, squamis calycinis subovatis, apice subulatis, longitudine tubi. Lin. h. Cliff. p. 165.

*Caryophyllus barbatus, hortensis, latifolius. C. B. Pin. p. 208. vs. 280. l.*

**DIANTHUS** floribus subsolitariis, petalis multifidis, basi canaliculatis. Lin. h. Upf. p. 105.

*Caryophyllus flore tenuissimo dissecto. C. B. Pin. 209. vs. 280. k.*

**DIANTHUS** floribus solitariis, squamis calycinis subulatis, longitudine tubi, patulis. Lin. h. Cliff. p. 164.

*Caryophyllus sinensi, supinus leucojifolio, flore unico. Tournef. Art. 1705. p. 348. T. 5. vs. 280. l.*

DIAN-



**DIANTHUS** floribus solitariis, squamis calycinis subovatis, brevissimis, corollis crenatis. Lin. h. Cliff. p. 164.

*Caryophyllus hortensis* Razi

*I. Caryophyllus maximus tricolor, flore alter alteri innato.* vs. 288. n.

**VIBURNUM** foliis trilobis, dentatis. Lin. h. Upf. p. 69.

*Opulus.* Lin. b. Cliff. p. 109.

*Sambucus rosea.* Lob. ic. 451. vs. 106. b.

**LONICERA** floribus verticillatis, terminalibus, sessilibus; foliis summis connato perfoliatis. Lin. h. Cliff. p. 58.

*Caprifolium italicum.* Dod. Pempt. p. 411.

*I. Caprifolium germanicum.* J. R. H. vs. 300.

**CAMPANULA** caule subdiviso, foliis oblongis crenatis, calycibus corolla longioribus, capsulis prismaticis. Lin. h. Upf. p. 41.

*Campanula arvensis erecta.* J. R. H.

*Speculum veneris.* Razi. Hist. p. 742.

Et Varietates. vs. 267. l.

**GENTIANA** foliis amplexi caulibus, floris fauce barbata. Hall. Helv. p. 473.

*Gentiana pratensis, flore lanuginoso.* C. B. J. R. H.

*Gentiana autumnalis.* Weinm. Tab. 534. d. vs. 337. x.

**GENTIANA** foliis longis, angustis, floribus in alis caulibus sessilibus. Hall. Helv. p. 477.

*Gentiana angustifolia autumnalis.* C. B. J. R. H.

*Gentianella autumnalis Pneumonanthe dicta* Weinm. Tab. 535. vs. 337. x.

**GENTIANA** caule unifloro, flore campanulato, caulis longitudinem excedente. Lin. h. Cliff. p. 81.

*Gentiana alpina magno flore.* J. B. III. p. 523. J. R. H.

*Gentianella verna major.* Clus. Pann. p. 284. Moriss. vs. 87. b. Sed deleatur Synonymum; *Gentianella*

nella fugax, flore cœruleo, colore elegantissimo. Est enim sequens:

**GENTIANA** humillima, caule ramoso, tubo floris longissimo. Hall. Helv. p. 475.

*Gentiana alpina pumila, centaurii minoris folio.* J. R. H.

*Gentianella fugax, quinta Clusii, flore cœruleo, colore elegantissimo.* J. B. III. p. 527.

**GENTIANA** floribus rotatis, verticillatis. Hall. Helv. p. 479.

*Gentiana major lutea.* C. B. Bas. p. 55. J. R. H.

*Gentiana floribus lateralibus confertis, pedunculatis, corollis rotatis.* Lin. h. Cliff. p. 80. Roy. Pr. p. 432. vs. 87. b.

**ANAGALLIS** Linn. Gen. 150. vs. 269. x.

**PRIMULA** foliis denticulatis rugosis Lin. h. Upf. p. 37.

*Primula veris hortensis*

Et Varietates. vs. 73. \*

**CONVOLVULUS** calycibus tuberculatis, pilosis. Gronov. Fl. Virg. p. 141.

Cum Varietatibus. vs. 23.

**IPOMOEA** foliis pinnatifidis linearibus, floribus solitariis. Linn. Fl. Zeyl. p. 77.

*Quamoclit foliis tenuiter incisiss & pinnatis.* J. R. H. v. 263. z.

**PASSIFLORA** foliis indivisis, cordato oblongis, integerrimis, petiolis biglandulosis, involucris integerrimis. Linn. Passif.

*Granadilla latifolia, fructu maliformi.* J. R. H. vs. 40\*

**PASSIFLORA** foliis indivisis integerrimis, involucris dentatis. Lin. Passif.

*Granadilla fructu citriformi, foliis oblongis.* J. R. H. vs. 42. \*\*

**PASSIFLORA** foliis indivisis, oblongis, integerrimis, floribus confertis. Linn. Passif.

*Clematis indica, polyanthos odoratissima.* Plum. Amer. p. 75. T. 90. vs. 45. †

**PASSIFLORA** foliis bilobis, basi emarginatis, petiolatis. Lin. Passif. Gra-



*Granadilla flore suave rubente, folio bicorni. J. R.*

*H. vs. 43. \**

PASSIFLORA foliis trilobis peltatis. Lin.  
Passif.

*Granadilla folio amplo tricuspidi, fructu olivæ formi. J. R. H.*

*I. Clematis indica folio angusto trifido, fructu olivæ formi. Plum. Amer. p. 70. T. 85. Est hujus Varietas. vs. 44. \*\**

PASSIFLORA foliis trilobis cordatis pilosis, involucris multifido capillaribus. Lin. Passif.

*Granadilla fœtida, folio tricuspidi villoso, flore albo. J. R. H. vs. 46. \**

PASSIFLORA foliis trilobis serratis. Linn. Passif.

*Passiflora foliis crenatis, tripartitodivisis. Pluk. Alm. p. 281.*

*Granadilla hispanis, flos passionis italica. J. R. H. vs. 26. \**

PASSIFLORA foliis palmatis integerrimis. Lin. Passif.

*Clematis pentaphylla, flore roseo clavato. Moriss. 2. p. 6 S. 1. T. 1. f. 8.*

*Granadilla pentaphyllos, flore cœruleo magno. Boerb. H. L. B. 2. p. 81. vs. 25. \*\**

PASSIFLORA foliis palmatis serratis. Lin. Passif.

*Granadilla polyphyllos, fructu Colocynthis. J. R. H. vs. 39. \*\**

MIRABILIS. Linn. h. Cliff. p. 53.

*Solanum mexicanum flore magno. C. B. Pin. p. 168. Jalappa. J. R. H.*

*Et Varietates. vs. 299. y.*

ATROPA. Linn. h. Cliff. p. 57.

*Bella donna majoribus foliis & floribus. J. R. H. vs. 297. u.*

VERBASCUM foliis amplexicaulibus, oblongis, glabris; pedunculis solitariis. Lin. h. Upf. p. 46. *Blat-*

- Blattaria lutea*, folio longo laciniato. C. B. Pin. p. 240. vs. 271. d.
- VINCA foliis ovatis. Lin. h. Cliff. p. 77.  
*Clematis daphnoides minor*. C. B. Pin. p. 301. vs. 270. a.
- LOBELIA caule erecto, foliis lanceolatis serratis, spica terminali. Lin. h. Cliff. p. 226.  
*Rapuntium maximum*, coccineo spicato flore. Herm. vs. 296 p.
- VIOLA acaulis, stolonibus teretibus reptantibus, pedunculis radicalibus. Lin. h. Cliff. p. 427.  
*Viola martia purpurea*, flore simplici odore J. R. H. vs. 95. c.
- IMPATIENS pedunculis solitariis multifloris. Lin. h. Cliff. p. 428. Hall. Helv. p. 205.  
*Impatiens Rivini*.  
*Balsamina lutea* f. *Noli me tangere* C. B. J. R. H. vs. 51. \*
- IMPATIENS pedunculis unifloris aggregatis, foliis lanceolatis, nectariis flore brevioribus. Lin. h. Upf. p. 276.  
*Impatiens pedunculis confertis unifloris*. Lin. h. Cliff. p. 428.  
*Balsamina fœmina* C. B. Pin. p. 306. vs. 300. b.
- JASMINUM foliis oppositis pinnatis. Lin. h. Cliff. 5. Roy. p. 397.  
*Jasminum vulgatus*, fl. albo C. B. Pin. p. 397. vs. 16. \*
- SYRINGA. Lin. Lilac. J. R. H. vs. 106 a.
- ALYSSUM ramulis suffruticosis diffusis, foliis punctato echinatis. Lin. h. Upf. 185.  
*Alyssum perenne*, montanum, incanum. J. R. H. vs. 271. c.
- LUNARIA foliis cordatis, perennis, siliqua longiore. Hall. Helv. p. 540. Cat. H. Goett. p. 54.  
*Lunaria foliis cordatis*. Linn. h. Cliff. p. 333. Roy. Pr. p. 332. Lit-



*Lunaria major, siliqua longiore. J. B. J. R. H.*  
vs. 94. b.

CHEIRANTHUS foliis lanceolatis, acutis,  
glabris. Lin. h. Cliff. p. 134. h. Upf. p. 187.  
Roy. p. 337. Hall. Cat. h. Gœtt. p. 57.

*Leucojum luteum. Dod. Pempt. p. 160. vs. 105.*  
Beilchen.

CHEIRANTHUS foliis lanceolatis, inte-  
gerrimis, obtusis, incanis. Lin. h. Cliff. p. 324.  
siliquis apice truncatis, compressis. Lin. h.  
Upf. p. 187.

*Leucojum incanofolio, hortense. C. B. Pin. p. 200.*  
1—7. vs. 269. y.

HESPERIS caule hispido, ramoso, procum-  
bente. Lin. Vir. p. 63. Roy. Pr. p. 338. Lin.  
h. Upf. p. 187.

*Hesperis colore ineleganti. J. B. Hist. II. p. 879.*

*Hesperis montana, pallida, odoratissima. C. B. Pin.*  
p. 202. vs. 81. \*

LOTUS. Lin. Gen. 710. vs. 269. u.

COLUTEA foliolis ovato lanceolatis, caule  
fruticoso. Lin. h. Cliff.

*Colutea ethiopica, flore phœniceo, Barbae Jovis folio.*

*Breyn. Prod. 1. p. 30. Boerb. H. L. B. 2. p. 39.*  
vs. 262. y.

LUPINUS calycibus alternis, absque appen-  
diculis. Lin. H. Upf. p. 209.

*Lupinus sativus, flore albo. Clus. vs. 268. r.*

CYTISUS foliis ovato oblongis, racemis sim-  
plicibus, pendulis. Lin. h. Cliff. p. 354. Hall.  
Helv. p. 591.

*Cytisus alpinus, latifolius, flore racemoso pendulo. J.*  
*R. H. vs. 106. c.*

LATHYRUS. Linn. Gen. 707. vs. 269. z.

ANTIRRHINUM. Lin. Gen. 589. vs.  
269. t.

DIGITALIS foliolis calycinis ovatis, acutis,  
P corol-

corollis obtusis, labio superiore integro. Lin. h. Upf. p. 178.

*Digitalis foliolis calycinis ovatis.* Lin. H. Cliff. p. 318. Roy. 292.

*Digitalis purpurea, folio aspero.* C. B. Pin. p. 243. vs. 268. p.

**DIGITALIS** foliolis calycinis lanceolatis, corollis acutis, labio superiore bifido. Lin. h. Upf. p. 178.

*Digitalis lutea, minore flore.* Moriss. S. V. T. 8. f. 5. vs. 268. p.

**DIGITALIS** foliis calycinis linearibus acutis; flore venoso, maculoso. Hall. Helv. p. 617. Cat. h. Goett. p. 68.

*Digitalis lutea, magno flore.* C. B. Pin. f. R. H. vs. 268. p.

**DIGITALIS** foliolis calycinis ovatis, obtusis, corolla villosa, labio longissimo.

*Digitalis foliolis calycinis ovatis, obtusis.* Roy. Pr. p. 292.

*Digitalis gilvo flore, alias ferrugineo.* Lob.

*Digitalis latifolia, flore ferrugineo.* Moriss. S. V. T. 8. Fig. 2.

I. *Digitalis angustifolia, flore ferrugineo.* Moriss. S. V. T. 8. f. 3. C. B. Pin. p. 244. vs. 268. p.

**MONARDA** floribus capitatis & verticillatis, caule acute angulato, foliis lanceolatoserratis, glabris.

*Monarda caule acute angulato, capitulisque terminatricibus.* Hort. sicc. Gronov. [Linn. h. Cliff. app. p. 495. obiter.]

I. *Monarda* flore albo, bracteis ex albo & viridi variis.

*Patria Pennsylvania.*

*Hicce locorum sub dio perennis.*

Hanc, splendidissima sua purpura elegantem plantam, novumque adonitum ornamentum, debemus Cl. Gronovio, qui primus e Pennsylvania



vania acceptam, Europæ donavit; in cujus horto primum etiam floruit 1739. Idemque Clarissimus Vir propediem hujus plantæ ut & aliarum plurimarum, quas antea nondum vidit curiosa Europa, descriptionem, (uti solet) eleganter dabit in nova Floræ suæ editione; quam cum certa novi apparatus novæque voluptatis spe, avide exspectat botanicorum sciendi cupido. Neque ego exoptare desino, licet nondum edita frui licuerit. vs. 294. o.

CENTAUREA calycibus inermibus, subrotundis glabris, squamis ovatis, foliis sinuatis. Lin. h. Cliff. p. 421.

*Cyanus floridus, odoratus, turcicus sive orientalis, major flore luteo.* J. R. H. vs. 266. f.

Et Varietates.

HELIANTHUS radice annua. Lin. h. Ups. p. 268.

*Corona solis. Tabern.*

*Helenium indicum, maximum.* C. B. Pin. p. 276.

vs. 338. z.

HELIANTHUS radice tereti, inflexa, perenni. Lin. h. Cliff. p. 419.

*Corona solis perennis & vulgaris.* Vaill. act. 1720. p. 432.

*Corona solis minor, fœmina.* Tabern. vs. 338. \*

RUDBECKIA ramis indivisis, unifloris; foliis ovato lanceolatis: hirta.

*Rudbeckia foliis lanceolato ovatis, alternis, indivisis petalis radii integris.* Gron. Fl. p. 181.

*Obeliscotheca barbulis flavis, umbone atropurpureo.*

Clayt. n. 490.

Patria Virginia.

Fert aëris nostri injurias.

DESCR. Ex radice perenni progerminat caulis, cubitalis, (& bicubitalis) punctis purpureis notatus, cui pili longi, albi, urentes, dense

insident; foliosus. Haud procul a terra; ab utraque parte duo caules laterales propul-  
lulant, qui non ultra divisi, sed paraleli cum  
medio procedunt. *Folia* caulibus alternatim  
adhærent, latis petiolis sustentata, lanceo-  
lata, ovata, hirta, integerrima. *Florum radii*  
rari, laxi, apice bifidi, externe sæpe villosi,  
coloris aurei. *Discus* acute conicus, pur-  
puro fuscus.

Hanc Cl. Linnæus pro varietate Rudbec-  
kiæ foliis inferioribus trilobis, superio-  
ribus indivisis. h. Ups. p. 269. habet: quæ  
est: Rudbeckia foliis trilobis. Gron. Fl. Vir-  
gin. p. 180. Quemadmodum enim ipsa  
plantarum viventium comparatio, differen-  
tiam specificam abunde nobis demonstravit;  
ita egregie confirmavit hortus siccus Cl.  
Gronovii, ubi primum, quod in Europam  
delatum fuit Exemplar, servatur.

Notæ distinctionis sunt sequentes.

*Nostra.*

Caulis. semel ramosus,  
Sessilis.

Folia. omnia integerri-  
ma, hirsutissima.

Florum *Radii*. laxi &  
multo longiores. *Dis-*  
*cus*. acute conicus.

*Alter.*

Caulis. superne ramo-  
sissimus, præaltus.

Folia radicalia triloba,  
caulina lanceolata,  
omnia serrata.

Florum longe mino-  
rum disci, hemi-  
sphærici.

ACHILLEA. Linn. Gen. 794. vs. 269. w.

BELLIS scapo nudo unifloro. Linn. Roy. Hall.

*Bellis sylvestris* [*Æbortensis*]. Dod. vs. 86. a.

CALENDULA seminibus radii cymbifor-  
mibus, echinatis, disci bicornibus. Lin. h. Cliff.

p. 425.

*Cal-*



*Caltha vulgaris.* C. B. Pin. vs. 264. a.

Et Varietates.

CALENDULA foliis lanceolatis, denticulatis, pedunculis filiformibus. Lin. h. Upf. p. 274.

*Calendula foliis dentatis.* Roy. Pr. p. 177.

*Dimorphotheca foliis incis, ovarii minoribus.* Vaill. vs. 264. a.

ASTER. Lin. Gen. 787. vs. 300. c.

TAGETES caule subdiviso, diffuso. Lin. h. Cliff. p. 418.

*Flos africanus.* Dod. Pempt. p. 255.

TAGETES caule simplici erecto, pedunculis nudis unifloris. Lin. h. Cliff. p. 418.

*Caryophyllus indicus.* Cam. epit. p. 406. vs. 339. a. 344. b. 342. c.

LIRIODENDRUM. Lin. h. Cliff. p. 223.

*Tulipifera arbor virginiana.* Herm. H. L. B. p. 612. T. 613.

Characterem hujus arboris, ex propria observatione, hic subjungere haud incongruum fore putavi; dum characteres hactenus propositi, non omnino convenient. Floruit hic Lugd. Bat. haud procul ab urbe 1748. 49. 50. in arboreto Boerhaviano.

CAL. Involucrum duplex.

*Ext.* Folia bina, triangula, plana, pedunculum tegentia, ejusdem fere longitudinis, decidua.

*Int.* f. Calix stricte dictus. Triphyllus, foliolis ovato oblongis, concavis, reflexis, petalis minoribus, deciduis.

COR. Liliaceocampaniformis, hexapetala; petalis tribus exterioribus majoribus, omnibus oblongis, erectis, patentibus, superne planis, obtusis, latioribus, inferne concavis, introflexis, angustioribus, deciduis.

STAM:

**STAM.** 24. corollæ parum breviora, a se invicem discreta, receptaculo fructificationis inserta, lineari plana; superne lateſcunt, & diffiliunt ab utroque angustiore latere in duas perpendiculares fissuras, quæ se ad medium staminis extendunt, & per lineam intermediam distinctæ sunt. Hæc pollinem feminalem album continent, & apicem vices gerunt.

**PIST.** Corpus conicum, strobiliforme, e squamis sibi invicem incumbentibus, circa axin positis, conflatum, in quarum apice stigma minimum, globosum hæret.

**PER.** Squamæ lanceolato lineares, planæ, inferne crassæ, a latere interiore angulum acutum formantes, cujus ope axi junguntur.

**SEM.** 2. (interdum unicum) in ungue squamarum latent; oblonga, crassiuscula, splendentia.

Obs. Petalorum numerus variat inter 6 & 9. In plurimis 6 observavi, quam ob causam hunc numerum regularem & legitimum judicavi. Multo constantior est staminum numerus, licet interdum quoque diversus sit. vs. 330. t.

---

Dabam e Musæo  
Lugduni Batavorum 15. Oct. 1750.